


BARKAÞRÆÐING - ERFIÐUR LOFTVEGUR



BARKARAUFARSKURÐUR

KALLA Á HJÁLÞ

Tilkynna um að hvorki sé hægt að barkapræða né halda uppi súrefnismettun

Áætlun D: Barkaraufarskurður (FONA - Front Of Neck Airway)

- Réttu úr hálsi
- Tryggja vöðvalömun
- Halda áfram að gefa súrefni
- Útiloka bilun tengda loftflæði eða búnaði

Barkaraufarskurður með hnífsblaði

- Tæki:**
- Hnífur númer 10 eða (með breiðu blaði)
 - Bougie leiðari / Frova leiðari
 - Barkarena númer 6

Preifa barkakýli (larynx) og finna cricothyroid himnuna

Preifanleg himna:

- Stinga og skera lárétt gegnum cricothyroid himnu
- Snúa blaðinu um 90 gráður, skarpi endinn að fótum
- Setja bougie leiðara meðfram blaðinu ofan í barka
- Renna barkarennu yfir leiðarann
- Setja loft í belginn (cuff), ventílera og staðfesta með koldíoxíðmælingu (capnografíu)
- Festa barkarennu

Ekki preifanleg himna:

- Gera langan lóðréttan skurð á háls í miðlinu (8 cm)
- Aðskilja vefi með fingrum til að finna barkakýli (larynx)
- Finna og stabilisera barkakýli (larynx)
- Halda áfram eins og lýst er að ofan

Fyrir sérþjálfaða starfsfólk

Aðrar aðferðir við barkaraufarskurð í öllum tilfellum koma til greina til dæmis percutaneous tracheostomia eða tracheostomia yfir leiðara.

Eftir barkaraufarskurð

- Soga í barkarennu
- Innlögn á gjörgæslu til eftirlits
- Meðferð í öndunarvél - recruitment
- Röntgenmynd af lungum
- Skrá atburðinn og tryggja að sjúklingurinn fái afrit af loftvegaskráningu